Utilisation d'antibiotiques

Indicateurs communs

Pourquoi ce thème ?

L'utilisation responsable des antibiotiques dans la production animale est d'une importance capitale pour préserver à long terme l'efficacité de ces médicaments essentiels et limiter l'apparition et la propagation de la résistance aux antibiotiques. Avec la stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques (StAR), la Suisse poursuit l'objectif de garantir durablement l'efficacité des antibiotiques et de limiter leur utilisation en médecine humaine et vétérinaire au strict nécessaire. Les mesures mises en œuvre ces dernières années ont déjà permis de réaliser des progrès significatifs.

Objectif

> *Préserver à long terme l'efficacité des principes actifs antibiotiques et prévenir l'apparition et la propagation des résistances.*

Indicateur

Utilisation d'antibiotiques (mg/PCU)

Unité : mg/PCU (mg de principe actif par kg de biomasse de la population)

A Utilisation d'antibiotiques en mg/PCU $\Sigma\ Wirkstoffmenge\ [mg]$ / PCU [kg]

B Utilisation d'antibiotiques en mg/PCU, ventilée par catégorie d'animaux

Quantité de principe actif (ventes ou prescriptions ; par classe/principe actif).
PCU1 (indicateur de biomasse par espèce animale)
Délimitation : espèces animales destinées à l'alimentation (bovins, porcs, volailles, etc.).

Données

Source

au niveau national : IS ABV / OFAV. Exploitation/secteur : ABIDAT, TVD

Fréquence

annuel, au moins sur une série de trois ans

Charge de travail

Automatique à partir des données existantes.

Interprétation et limites

Plus la valeur est faible, mieux c'est ; l'accent est mis sur la tendance (par exemple, variation par rapport à l'année précédente)

- Cet indicateur est particulièrement adapté aux analyses de tendances et à l'évaluation des progrès réalisés au niveau national ou sectoriel.
- Il peut être combiné avec des sources de données d'entreprise (par exemple ABIDAT), ce qui permet une interprétation plus nuancée.
- L'indicateur mg/PCU ne fait pas la distinction entre les substances actives critiques et celles qui le sont moins ; des regroupements complémentaires par résistance ou par classe de substances actives sont nécessaires pour cela.

Résumé : les informations méthodologiques complètes figurent dans la fiche descriptive (site web).

Christof Dietler (IGAS), David Rüetschi (SALS), Adrian Rutzer (IfA)